

農薬散布履歴記入表				薄緑色のセルはJA防除室を変更して記載				備考	
防除区	散布日 月/日 散布量 g/10a	散布 チェック 散布量 ×記入	区分	薬剤名	倍数	使用時期 又は 収穫前 日数	年間 使用 回数	※圃地により散布 日が5日以上ずれた 場合は、圃地No.・月 日を記入 ※圃地により薬剤 の選択が違ふ場合は 明記	
特別	/	×		適用表No.()				圃地No.	
	4月17日 ~ /	×		適用表No.()				圃地No.	
1 展葉1週 後	280g	×	展着	ペフラン液剤	1,000倍	展葉期	6回(開花後3回)	圃地No.	
	4月24日 ~ /	×	ダニ	ハーベストオイル	200倍	展葉期(展葉後3週間)	-	圃地No.	
2 開花 前	280g	×	展着	ハーベストオイル	200倍	展葉期	6回(開花後3回)	圃地No.	
	5月4日 ~ /	×	展着	ダズバンドF	3,000倍	45日	1回	圃地No.	
3 落花 直後	280g	×	展着	ペフラン液剤	1,000倍	展葉期	6回(開花後3回)	圃地No.	
	5月15日 ~ /	×	展着	適用表No.(80)				圃地No.	
4 落花 10日後	305g	×	展着	適用表No.(40)				圃地No.	
	5月24日 ~ /	×	展着	オルフィンフロアブル	4,000倍	7日	3回	圃地No.	
5 落花 20日後	305g	×	展着	アンピルフロアブル	2,000倍	7日	3回	圃地No.	
	6月1日 ~ /	×	展着	バイオマックスDF	2,000倍	前日	-	圃地No.	
6 落花 30日後	365g	×	展着	適用表No.(80)				圃地No.	
	6月10日 ~ /	×	展着	適用表No.(6)				圃地No.	
7 落花 40日後	403g	×	展着	ユニックス顆粒水和剤	2,000倍	14日	4回	圃地No.	
	6月21日 ~ /	×	展着	ジマンダイセン水和剤	600倍	30日	3回	圃地No.	
8 7月初め	421g	×	展着	適用表No.(80)				圃地No.	
	7月5日 ~ 7/6	×	展着	適用表No.(86)				圃地No.	
9	414g	×	展着	適用表No.(86)				圃地No.	
	7月18日 ~ 7/19	×	展着	チオノックフロアブル	500倍	30日	5回	圃地No.	
10	414g	×	展着	適用表No.(87, 100)				圃地No.	
	8月13日 ~ /	×	展着	適用表No.(80)				圃地No.	
11	414g	×	展着	適用表No.(87, 100)				圃地No.	
	8月27日 ~ /	×	展着	適用表No.(80)				圃地No.	
12	419g	×	展着	適用表No.(87, 100)				圃地No.	
	9月16日 ~ 9/17	×	展着	適用表No.(80)				圃地No.	
特別	462g	×	展着	適用表No.()				中晩生種 1.2-1の-部4.6の-部	

上記基本防除以外の薬剤散布(天候等により特別散布を実施した場合等)は下記に記入する。

散布日・月/日	圃地No.記入	薬剤名	倍数	備考
9/3	422g	適用表No.(103)	2000倍	5-7月以降にもラウリン酸が検出される
/	g	適用表No.()	倍	
/	g	適用表No.()	倍	
/	g	適用表No.()	倍	
/	g	適用表No.()	倍	
/	g	適用表No.()	倍	

区分	薬剤名	倍数	散布品種名	散布月日	区分・薬剤名	倍数	散布品種名	散布月日
摘花剤	エコルーキー	倍	品種() /		ツル割れ摘花剤 ピオモン水溶液 展葉後20 ~30日頃	倍	品種() /	
	石灰硫黄合剤	倍	品種() /			倍	品種() /	
20E剤	100~120倍	倍	品種() /		落葉防止剤	1000倍	品種(きおう) /	8/10
	1200倍	倍	品種() /		ストッポール	1500倍	品種(つがる) /	8/18
摘果剤	マイクロナボン	1,200倍	品種() /			1500倍	品種(北斗) /	9/16
	年間使用回数2回	1,200倍	品種(6号圃地) /	5/28		倍	品種() /	
摘葉剤	ジョンカラブ	500倍	品種(4号圃地) /	9/16		倍	品種() /	
	500~1,500倍	500倍	品種(2-4号圃地) /	9/16		1000倍	品種(ツル割れ) /	8/5
前線ラウリン酸1000倍併用	500倍	500倍	品種(2-1号圃地) /	9/16		2000倍	品種(つがる) /	9/3
						2000倍	品種(紅玉) /	9/5
						2000倍	品種(紅玉) /	9/20
						1000倍	品種(ツル割れ) /	9/20
						2000倍	品種(北斗) /	9/30

適用表 同一系統では成分回数にも注意して下さい。

区分	系統 又は 成分 区分け	No.	薬剤名	倍数	使用時期 又は 収穫前 日数	年間 使用 回数	
令 菌	イミノクタジン	1	石灰硫黄合剤(サンソー液)	7倍	発芽前	-	
		2	ペフラン液剤	1,000倍	展葉期	6回(開花後3回)	
		3	ペフラン液剤	1,500倍	前日		
		4	ペフラン液剤	2,000倍	前日		
		5	フルーツセイバー	2,000倍	前日	3回	
		6	ネクスターフロアブル	1,500倍	前日	3回	
		SDHI	7	アンピルフロアブル	2,000倍	7日	3回
			8	インダーフロアブル	10,000倍	14日	3回
			9	スコア顆粒水和剤	3,000倍	14日	3回
			10	ブロード水和剤	500倍	30日	3回
			11	アスバイア水和剤	500倍	30日	3回
		EBI	12	ジマンダイセン水和剤	600倍	30日	3回
			13	チオノックフロアブル	500倍	30日	5回
		EBI混合 (EBI+ジマン)	14	ユニックス顆粒水和剤	2,000倍	14日	4回
			15	ユニックス顆粒水和剤	2,000倍	14日	4回
	マンゼブ	16	イオウフロアブル	500倍	-	-	
		17	コロナフロアブル	500倍	-	-	
	チウラム	18	ラビライト水和剤	500倍	60日	2回	
		19	デランフロアブル	2,000倍	60日	3回	
	AP剤	20	アントラコール顆粒水和剤	500倍	45日	4回	
		21	バスポート顆粒水和剤	1,000倍	45日	3回	
硫黄	22	ICホルダー412	倍	-	-		
	23	オキシンドー水和剤80	1,200倍	14日	4回		
銅剤	24	キノンドー水和剤80	1,200倍	14日	4回		
	25	キノンドー顆粒水和剤	1,000倍	14日	4回		
銅剤	26	ビオネクト	1,000倍	14日	4回		
	27	オキシラン水和剤	500倍	14日	4回		
銅剤	28	ダイパー水和剤	1,000倍	前日	3回		
	29	アリエッティC水和剤	800倍	前日	3回		
銅剤	30	ナリアWDG	2,000倍	前日	3回		
	31	トップジンM水和剤	1,000倍	前日	6回		
銅剤	32	トップジンM水和剤	1,500倍	前日	6回		
	33	ベンレート水和剤	3,000倍	前日	4回		
銅剤	34	オーソサイド水和剤	800倍	前日	6回		
	35	ストライド顆粒水和剤	1,500倍	前日	3回		

殺 虫	IGR剤	40	アブロードフロアブル	1,000倍	30日	2回
		41	デミリン水和剤	4,000倍	30日	3回
殺 虫	BT剤	42	ノーモルト乳剤	4,000倍	前日	2回
		43	カスケード乳剤	4,000倍	14日	2回
殺 虫	有根リン	44	バイオマックスDF	2,000倍	前日	-
		45	ファイブスター顆粒水和剤	2,000倍	前日	-
殺 虫	有根リン	46	ティアナWDG	10,000倍	前日	2回
		47	ダズバンドF	3,000倍	45日	1回
殺 虫	有根リン	48	スプラサイド水和剤	1,500倍	30日	2回
		49	エルサン水和剤	1,000倍	45日	2回
殺 虫	有根リン	50	ダイアジノン水和剤	1,000倍	30日	4回
		51	サイアノックス水和剤	1,000倍	14日	1回
殺 虫	含ビレ	52	サイハロン水和剤	2,000倍	7日	3回
		53	バイスロイドEW	2,000倍	7日	4回
殺 虫	含ビレ	54	イカズチWDG	1,500倍	前日	2回
		55	ダントツ水溶液	4,000倍	前日	3回
殺 虫	ネオニコ	56	バリアード顆粒水和剤	4,000倍	前日	3回
		57	モスピラン顆粒水溶液	4,000倍	前日	3回
殺 虫	ジアミド	58	フェニックスフロアブル	4,000倍	前日	2回
		59	サムコルフロアブル	5,000倍	前日	3回
殺 虫	ジアミド	60	エクシレルSE	5,000倍	前日	3回
		61	オリオン水和剤40	1,000倍	前日	2回
殺 虫	ジアミド	62	ウララDF	4,000倍	14日	2回
		63	コルト顆粒水和剤	6,000倍	前日	3回
殺 虫	ジアミド	64	キラップフロアブル	2,000倍	14日	2回

ダ ニ 剤	この3剤に併用しては、当年でいずれか1剤の使用にしましょう。	70	マシン油乳剤()	200倍	展葉期	-
		71	ハロックフロアブル	2,000倍	14日	2回
ダ ニ 剤	この3剤に併用しては、当年でいずれか1剤の使用にしましょう。	72	エコマイト顆粒水和剤	2,000倍	7日	1回
		73	ダニコングフロアブル	2,000倍	前日	1回
ダ ニ 剤	この3剤に併用しては、当年でいずれか1剤の使用にしましょう。	74	ダニサラフロアブル	1,000倍	前日	2回
		75	スターマイトフロアブル	2,000倍	前日	1回
ダ ニ 剤	この3剤に併用しては、当年でいずれか1剤の使用にしましょう。	76	マイトコーネフロアブル	1,000倍	前日	1回
		77	コロマイト乳剤	1,000倍	前日	1回
ダ ニ 剤	この3剤に併用しては、当年でいずれか1剤の使用にしましょう。	78	オマイト水和剤	750倍	3日	1回

展 着 剤	果 面 保 護	80	ラビテン3S	10,000倍	-	-
		81	ネオエステリン	倍	-	-
展 着 剤	果 面 保 護	82	アピオンE	2000倍	-	-
		83	クレフノン	100倍	-	-
展 着 剤	果 面 保 護	84	ネオミクス	250倍	-	-
		85	クレミクス	333倍	-	-
展 着 剤	果 面 保 護	86	バイカルティ	1,000倍	-	-
		87	スイカル	333倍	-	-
展 着 剤	果 面 保 護	88	セルバイン	倍	-	-
		89	ストビットII	500倍	-	-

展 着 剤	果 面 保 護	100	トップスコアリン	1,000倍	-	-
		101	サンマイト水和剤	1,500倍	-	-
		102	コナゲシ顆粒水和剤	4,000倍	-	-
		103	アカリタッチ乳剤	2,000倍	前日	
		104		倍		
展 着 剤	果 面 保 護	105		倍		